




Het gebruik van colistine in de diergeneeskunde



IN NAVOLGING VAN DE CLASSIFICATIE VAN COLISTINE ALS KRITISCH BELANGRIJK ANTIBIOTICUM MET HOOGSTE PRIORITEIT VOOR DE MENS

BELGIË MOET ZICH BLIJVEN INSPANNEN OM NIET MEER DAN 1 MG/KG BIOMASSA PER JAAR TE GEBRUIKEN.



Maatregelen ter vermindering van het gebruik van colistine:



Voorkom maagdarminfecties bij biggen: niet vroeger spenen dan 28 dagen, vaccinatie, aangepast voederregime, gebruik van pre- en probiotica, hygiëne en bioveiligheid, geschikt stalklimaat, kwaliteit drinkwater, beperkte groepsgrootte (<60-80), tomen bijhouden bij het spenen, ...



Geen preventieve behandeling van groepen dieren



Geen colistine gebruik als 1^{ste} keuze middel



Voorafgaand etiologisch onderzoek om de diagnose te bevestigen en gevoeligheidstest aanbevolen



Een orale toediening van colistine is enkel geschikt voor maagdarminfecties. Bij systemische infecties moet colistine parenteraal worden toegediend.



Benchmarking van het colistinegebruik op veehouderijen: identificatie van veehouderijen met een hoog gebruik en dierenartsen met een hoog voorschrijf- en verschaffingsgedrag met het oog op het uitvoeren van verbeterpunten